

# 此病特征就是手掌、手指反复起粟粒大小丘疹和水疱

手脱皮怎么办 <http://www.yncte.com>

此病特征就是手掌、手指反复起粟粒大小丘疹和水疱

很多人一到夏天双手就起水疱、瘙痒、脱皮，用各种方法治疗，总也去不了根，每年都犯，为此烦恼不已。

这种现象比较多见，医学上称此为汗疱疹。其病因至今尚未完全清楚，多数人以为系非特异性皮肤湿疹样反应，学习此病特征就是手掌、手指反复起粟粒大小丘疹和水疱。与小我体质、动物神经功能紊乱、精神因素等相关。此病特征就是手掌、手指屡屡起粟粒大小丘疹和水疱，周围无明显炎症，疱壁较厚，发端疱液透明，以后变混浊，2~3天后疱液自行吸收，冬天手脱皮缺什么。干涸后形成脱屑，露出粉红色新生上皮，在手指屈伸中形成线状皲裂，皮疹呈对称性分布，自发患处瘙痒、灼痛。夏季潮热好发，小丘。秋后可不治自愈，看着3gp格式转换设置。易屡屡发作持续数年。就是。你知道为什么冬天手脱皮。

对于该病的预防和治疗没有特效方法，生活中要忌食辛辣、酒、咖啡等刺激性食物，少吸或不吸烟，少用或不用碱性肥皂、洗衣粉、洗涤剂洗手。出现水疱不要挑破，更不要撕皮。局部治疗以收敛止痒为主如：炉甘石洗剂、5%的福尔马林或1%乌洛托品、痱子粉等。水疱明显可用0.5%醋酸铝溶液或5%明矾液浸泡或湿敷。宝宝手脱皮怎么回事。瘙痒明显者可用皮质类固醇激素制剂如去炎松、复方康纳乐霜、支洛松等。如以红斑、脱屑、皲裂为主，可用10%尿素霜、硅霜、维生素E霜、水杨酸软膏外涂，每月1~2次。全身治疗可用抗组胺药、维生素B1、B2、A、E。若皮疹数量多、自发病状明显可短程口服皮质类固醇激素如强的松，每次10毫克，每天3次，连服5~7天后症状减轻。

<http://www.yncte.com/shoutuopishishimeyuanyin/20120118/501.html>

中医治疗汗疱疹有何特点?

汗疱疹不仅影响手部雅观，而且常因瘙痒影响患者生活。严重者可继发感染，听听丘疹。出现手部的肿胀，疼痛。由于本病的原因尚不十分明确，所以中医尚无满意的疗法根除之。

中医治疗本病有很久的历史，早在明代就称之为“蚂蚁窝”。由于表现为深在水疱为主，所以应属湿邪偏盛。中医的治疗是多方面进行的。综合内外治疗，学习手脱皮是什么病。加以饮食、情绪调理：

(1)内治法

## 冬天手脱皮怎么治

干冷内盛证 掌跖多有深在水疱，集簇成群，针尖大小，学会为什么冬天手脱皮。瘙痒钻心，揩破水疱，手掌。滋水黄粘，伴舌红苔腻，脉象滑数。听听冬天手脱皮缺什么。治宜清热除湿法。药用：黄芩10g，黄连10g，苍术15g，陈皮10g，茯苓10g，六一散10g(包煎)，生苡仁30g，丹皮10g。水煎服，每日1剂。想知道此病特征就是手掌、手指反复起粟粒大小丘疹和水疱。

脾虚湿盛证 掌跖散在水疱，针尖至粟米大小，半透明状，疱液清稀，时有瘙痒，伴舌淡水滑，脉象濡滑。治宜健脾除湿法。冬天手脱皮缺什么。药用：茯苓12g，白术10g，泽泻10g，白扁豆10g，车前子10g(包煎)，每年冬天手脱皮。炒苡仁60g，炒山药30g，冬瓜皮60g。水煎服，每日1剂。听听水疱。

(2)外治法 根据本病以湿邪为主的特点，可用收湿敛疱法：王不留行60g，

经他用额头汗医治好厚茧的已有20多人

### 手脱皮是什么病.同为癣病用药有别

明矾30g，石榴皮30g，水煎取汁，泡洗患处，听听皮肤干燥脱皮怎么办。每次5分钟，日2次。

(3)饮食疗法 多吃有健脾除湿功效的蔬菜、水果，如山药、甘薯、冬瓜、西瓜、赤小豆、南瓜。少吃辛辣厚味，肥甘酒酪。

(4)其他 减少接触肥皂、碱、洗衣粉、洗涤灵、汽油、酒精等物；保持情怀畅达，避免七情不遂；不要用手撕脱蜕皮，以防染毒成脓。

汗疱疹和手癣、湿疹、接触性皮炎、剥脱性角质松解症的鉴别

<http://www.yncte.com/shoutuopishishimeyuanyin/20120118/495.html>

手癣俗称鹅掌风，是由真菌感染引起的。患了手癣会常常感到瘙痒，手部皮肤还会出现丘疹、水疱、红斑和脱屑。初起为小片，我不知道儿童手脱皮怎么回事。随后损害逐渐扩大，界线清楚。时间长了，手部皮肤会变得粗糙、干燥、增厚，还可伴有皲裂和出血。但是如果出现手痒、脱皮等症状，能不能说就必然是手癣呢?当然不能，还有很多皮肤病都可以见到手痒、脱皮的症状，如湿疹、汗疱疹、接触性皮炎、剥脱性角质松解症等，应仔细鉴别，相比看反复。否则会延误诊断和治疗。

湿疹多发生在手掌心，且双手对称。皮损呈多形态，可见丘疹、水疱、糜烂、渗液和结痂等同时生存，常以其中二至三种为主。病情变化与季节关系亲密，与饮食和暂息也有必然关联。如果双手掌接触水和肥皂等刺激会加重损害。真菌检查为阴性。看看冬天手脱皮怎么治。

汗疱疹的发生有明显的季节性，多于春夏之交发病，入冬自愈，主要见于青年人。皮损也是对称分布，以水疱为主，成批发作，可见于手掌面、指侧面和指端，水疱干涸后脱皮，露出新生皮肤，常伴有不同程度的痒感和灼热感。看看每年冬天手脱皮。本病发生与出汗不良或过敏反应有必然关系，损害处真菌检查为阴性。

接触性皮炎是因接触了引起过敏的物质后引起的，是皮肤的过敏反应，有明显的接触史。皮损发生于接触部位，境界清楚，形态较一致，多以红斑、水肿为主，严重者可见水疱、大疱等。脱离接触物后可逐渐消退至痊愈。局部真菌检查为阴性。

## 手脱皮是什么病

剥脱性角质松解症是一种表浅的掌跖部角质剥脱性皮肤病，常伴有局部多汗，手指。易于暖热季节发作。皮损主要累及手足心，双侧对称，表现为角质松离形成的小白点及易剥脱的薄纸样鳞屑，其下皮肤正常，瘙痒不明显。真菌检查阴性。发病原因不详，可能和手汗和精神紧张等因素相关。如果症状不重可不处理，因该病有自愈倾向。想知道特征。但起皮疹时尽量少接触肥皂洗洁精等碱性物质及酒精等，不要用手去撕脱翘起的皮，这样会加重皮损。可外用10%-20%尿素脂，1~2次/天

## 皮肤干燥脱皮怎么办

### 你知道皮肤干燥脱皮怎么办

### 其实大小

### 此病特征就是手掌、手指反复起粟粒大小丘疹和水疱

很多人一到夏天双手就起水疱、瘙痒、脱皮，用各种方法治疗，总也去不了根，每年都犯，为此烦恼不已。这种现象比较多见，医学上称此为汗疱疹。其病因至今尚未完全清楚，多数人认为系非特异性皮肤湿疹样反应，与个人体质、植物神经功能紊乱、精神因素等有关。此病特征就是手掌、手指反复起粟粒大小丘疹和水疱，周围无明显炎症，疱壁较厚，开始疱液透明，以后变混浊，2~3天后疱液自行吸收，干涸后形成脱屑，露出粉红色新生上皮，在手指屈伸中形成线状皲裂，皮疹呈对称性分布，自觉患处瘙痒、灼痛。夏季潮热好发，秋后可不治自愈，易反复发作持续数年。对于该病的预防和治疗没有特效方法，生活中要忌食辛辣、酒、咖啡等刺激性食物，少吸或不吸烟，少用或不用碱性肥皂、洗衣粉、洗涤剂洗手。出现水疱不要挑破，更不要撕皮。局部治疗以收敛止痒为主如：炉甘石洗剂、5%的福尔马林或1%乌洛托品、痱子粉等。水疱明显可用0.5%醋酸铝溶液或5%明矾液浸泡或湿敷。瘙痒明显者可用皮质类固醇激素制剂如去炎松、复方康纳乐霜、支洛松等。如以红斑、脱屑、皲裂为主，可用10%尿素霜、硅霜、维生素E霜、水杨酸软膏外涂，每月1~2次。全身治疗可用抗组胺药、维生素B1、B2、A、E。若皮疹数量多、自觉症状明显可短程口服皮质类固醇激素如强的松，每次10毫克，每天3次，连服5~7天后症状减轻。中医治疗汗疱疹有何特点？汗疱疹不仅影响手部美观，而且常因瘙痒影响患者生活。严重者可继发感染，出现手部的肿胀，疼痛。由于本病的原因尚不十分明确，所以西医尚无满意的疗法根除之。中医治疗本病有很久的历史，早在明代就称之为“蚂蚁窝”。由于表现为深在水疱为主，所以应属湿邪偏盛。中医的治疗是多方面进行的。综合内外治疗，加以饮食、情绪调理：(1)内治法 湿热内盛证 掌跖多有深在水疱，集簇成群，针尖大小，瘙痒钻心，揩破水疱，滋水黄粘，伴舌红苔腻，脉象滑数。治宜清热除湿法。药用：黄芩10g，黄连10g，苍术15g，陈皮10g，茯苓10g，六一散10g(包煎)，生苡仁30g，丹皮10g。水煎服，每日1剂。脾虚湿盛证 掌跖散在水疱，针尖至粟米大小，半透明状，疱液清稀，时有瘙痒，伴舌淡水滑，脉象濡滑。治宜健脾除湿法。药用：茯苓12g，白术10g，泽泻10g，白扁豆10g，车前子10g(包煎)，炒苡仁60g，炒山药30g，冬瓜皮60g。水煎服，每日1剂。(2)外治法 根据本病以湿邪为主的特点，可用收湿敛疱法：王不留行60g，明矾30g，石榴皮30g，水煎取汁，泡洗患处，每次5分钟，日2次。(3)饮食疗法 多吃有健脾除湿功效的蔬菜、水果，如山药、甘薯、冬瓜、西瓜、赤小豆、南瓜。少吃辛辣厚味，肥甘酒酪。(4)其他 减少接触肥皂、碱、洗衣粉、洗涤剂、汽油、酒精等物；保持情怀畅达，避免七情不遂；不要用手撕脱蜕皮，以防染毒成脓。汗疱疹和手癣、湿疹、接触性皮炎、剥脱性角质松解症的鉴别，手癣俗称鹅掌风，是由真菌感染引起的。患了手癣会常常感

到瘙痒，手部皮肤还会出现丘疹、水疱、红斑和脱屑。初起为小片，随后损害逐渐扩大，界线清楚。时间长了，手部皮肤会变得粗糙、干燥、增厚，还可伴有皲裂和出血。但是如果出现手痒、脱皮等症状，能不能说就一定是手癣呢？当然不能，还有很多皮肤病都可以见到手痒、脱皮的症状，如湿疹、汗疱疹、接触性皮炎、剥脱性角质松解症等，应仔细鉴别，否则会延误诊断和治疗。湿疹多发生在手掌心，且双手对称。皮损呈多形态，可见丘疹、水疱、糜烂、渗液和结痂等同时存在，常以其中二至三种为主。病情变化与季节关系密切，与饮食和休息也有一定关联。如果双手掌接触水和肥皂等刺激会加重损害。真菌检查为阴性。汗疱疹的发生有明显的季节性，多于春夏之交发病，入冬自愈，主要见于青年人。皮损也是对称分布，以水疱为主，成批发作，可见于手掌面、指侧面和指端，水疱干涸后脱皮，露出新生皮肤，常伴有不同程度的痒感和灼热感。本病发生与出汗不良或过敏反应有一定关系，损害处真菌检查为阴性。接触性皮炎是因接触了引起过敏的物质后引起的，是皮肤的过敏反应，有明显的接触史。皮损发生于接触部位，境界清楚，形态较一致，多以红斑、水肿为主，严重者可见水疱、大疱等。脱离接触物后可逐渐消退至痊愈。局部真菌检查为阴性。剥脱性角质松解症是一种表浅的掌跖部角质剥脱性皮肤病，常伴有局部多汗，易于暖热季节发作。皮损主要累及手足心，双侧对称，表现为角质松离形成的小白点及易剥脱的薄纸样鳞屑，其下皮肤正常，瘙痒不明显。真菌检查阴性。发病原因不详，可能和手汗和精神紧张等因素有关。如果症状不重可不处理，因该病有自愈倾向。但起皮疹时尽量少接触肥皂洗洁精等碱性物质及酒精等，不要用手去撕脱翘起的皮，这样会加重皮损。可外用10%-20%尿素脂，1~2次/天。能不能说就一定是手癣呢。是皮肤的过敏反应：疱壁较厚？是由真菌感染引起的。泡洗患处，药用：黄芩10g！脉象濡滑：黄连10g？少吃辛辣厚味？其病因至今尚未完全清楚。汗疱疹不仅影响手部美观。水煎服...簇成群，若皮疹数量多、自觉症状明显可短程口服皮质类固醇激素如强的松...由于本病的原因尚不十分明确。陈皮10g，肥甘酒酪，湿疹多发生在手掌心，保持情怀畅达：入冬自愈，针尖大小。脱离接触物后可逐渐消退至痊愈。明矾30g：皮损主要累及手足心...境界清楚。瘙痒不明显，汗疱疹的发生有明显的季节性，界线清楚。接触性皮炎是因接触了引起过敏的物质后引起的，多以红斑、水肿为主！1~2次/天，真菌检查阴性，如果症状不重可不处理。2~3天后疱液自行吸收，水疱干涸后脱皮。伴舌红苔腻。形态较一致，如湿疹、汗疱疹、接触性皮炎、剥脱性角质松解症等？病情变化与季节关系密切。每月1~2次。手癣俗称鹅掌风。针尖至粟米大小...瘙痒钻心。如山药、甘薯、冬瓜、西瓜、赤小豆、南瓜，但是如果出现手痒、脱皮等症状，损害处真菌检查为阴性，双侧对称！半透明状，中医治疗本病有很久的历史：其下皮肤正常。湿热内盛证掌跖多有深在水疱。皮疹呈对称性分布，车前子10g(包煎)。治宜清热除湿法，可见丘疹、水疱、糜烂、渗液和结痂等同时存在，局部真菌检查为阴性。

早在明代就称之为“蚂蚁窝”，露出新生皮肤，滋水黄粘。生苡仁30g，周围无明显炎症，出现水疱不要挑破，揩破水疱。很多人一到夏天双手就起水疱、瘙痒、脱皮。在手指屈伸中形成线状皲裂：瘙痒明显者可用皮质类固醇激素制剂如去炎松、复方康纳乐霜、支洛松等。石榴皮30g，还可伴有皲裂和出血。5%醋酸铝溶液或5%明矾液浸泡或湿敷，综合内外治疗；与个人体质、植物神经功能紊乱、精神因素等有关：表现为角质松离形成的小白点及易剥脱的薄纸样鳞屑？可能和手汗和精神紧张等因素有关。每次10毫克，皮损发生于接触部位。为此烦恼不已：疱液清稀！所以应属湿邪偏盛？不要用手去撕脱翘起的皮，水煎服；这样会加重皮损。(4)其他减少接触肥皂、碱、洗衣粉、洗涤剂、汽油、酒精等物，可外用10%-20%尿素脂，中医治疗汗疱疹有何特点。应仔细鉴别，发病原因不详...因该病有自愈倾向，而且常因瘙痒影响患者生活，可用10%尿素霜、硅霜、维生素E霜、水杨酸软膏外涂，常以其中二至三种为主，露出粉红色新生上皮。炒苡仁60g；总也去不了根...皮损呈多形态。以防染毒成脓：时间长了，手部皮肤还会出现丘疹、水疱、红斑和脱屑，加以饮食、情绪

调理：。泽泻10g...避免七情不遂。常伴有局部多汗...主要见于青年人，干涸后形成脱屑，易于暖热季节发作，(3)饮食疗法 多吃有健脾除湿功效的蔬菜、水果，当然不能，(2)外治法 根据本病以湿邪为主的特点：六一散10g(包煎)。

苍术15g，日2次，炒山药30g，冬瓜皮60g。否则会延误诊断和治疗...这种现象比较多见。患了手癣会常常感到瘙痒...脉象滑数，可用收湿敛疱法：王不留行60g，随后损害逐渐扩大。初起为小片！水煎取汁。白术10g，时有瘙痒，每日1剂。出现手部的肿胀：真菌检查为阴性；伴舌淡水滑，严重者可见水疱、大疱等。如以红斑、脱屑、皲裂为主，少用或不用碱性肥皂、洗衣粉、洗涤灵洗手，连服5~7天后症状减轻。少吸或不吸烟，每次5分钟，可见于手掌面、指侧面和指端！开始疱液透明，水疱明显可用0...(1)内治法；汗疱疹和手癣、湿疹、接触性皮炎、剥脱性角质松解症的鉴别，以后变混浊：多于春夏之交发病，每天3次；但起皮疹时尽量少接触肥皂洗洁精等碱性物质及酒精等。严重者继发感染，秋后不治自愈；还有很多皮肤病都可以见到手痒、脱皮的症状，与饮食和休息也有一定关联。不要用手撕脱蜕皮：全身治疗可用抗组胺药、维生素B1、B2、A、E，由于表现为深在水疱为主。

脾虚湿盛证 掌跖散在水疱。对于该病的预防和治疗没有特效方法，药用：茯苓12g，剥脱性角质松解症是一种表浅的掌跖部角质剥脱性皮肤病。皮损也是对称分布，夏季潮热好发；多数人认为系非特异性皮肤湿疹样反应，手部皮肤会变得粗糙、干燥、增厚？每日1剂，用各种方法治疗...医学上称此为汗疱疹：治宜健脾除湿法。且双手对称。白扁豆10g。中医的治疗是多方面进行的，丹皮10g，常伴有不同程度的痒感和灼热感！每年都犯：如果双手掌接触水和肥皂等刺激会加重损害，以水疱为主，自觉患处瘙痒、灼痛？易反复发作持续数年。成批发作；本病发生与出汗不良或过敏反应有一定关系，有明显的接触史？所以西医尚无满意的疗法根除之，生活中要忌食辛辣、酒、咖啡等刺激性食物！茯苓10g。更不要撕皮，此病特征就是手掌、手指反复起粟粒大小丘疹和水疱。局部治疗以收敛止痒为主如：炉甘石洗剂、5%的福尔马林或1%乌洛托品、痱子粉等，